

Tratamiento	Compatible con la concepción	Compatible con el 1er trimestre de embarazo	Compatible con el 2º y 3er trimestre de embarazo	Compatible con la lactancia	Compatible con la exposición paterna
Corticoides					
Prednisolona	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Metilprednisolona	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Antimaláricos					
Hidroxicloroquina	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí a
Fármacos modificadores de la enfermedad					
Metotrexato <20 mg/semana	Dejarlo 3 meses antes	No	No	No	Sí a
Sulfasalacina con 5mg ác. Fólico	Sí	Sí	Sí	Sí b	Sí c
Leflunomida	Necesario procedimiento de lavado con colestiramina, NO	No	No	No hay datos	Sí a
Azatioprina <2 mg/kg/día	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ciclosporina	Sí	Sí d	Sí d	Sí a	Sí a
Tacrolímús	Sí	Sí d	Sí d	Sí a	Sí a
Ciclofosfamida	No	No e	No e	No	No
Micofenolato	Dejarlo 6 semanas antes	No	No	No	Sí a
Inmunoglobulinas IV	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí a
Tratamientos anti TNF					
Infliximab	Sí	Sí	Parar en la semana 16	Sí a	Sí a
Etanercept	Sí	Sí	En el segundo sí, pero no en el tercero	Sí a	Sí a
Adalimumab	Sí	Sí	En el segundo sí, pero no en el tercero	Sí a	Sí a
Certolizumab	Sí	Sí	Sí a	Sí a	No hay datos
Golimumab	No hay datos	No hay datos	No hay datos	No hay datos	No hay datos
Otros biológicos					
Rituximab	Dejarlo 6 meses antes	No f	No	No hay datos	Sí a
Tocilizumab	Dejarlo 3 meses antes	No f	No	No hay datos	No hay datos g
Anakinra	No	No f	No	No hay datos	No hay datos g
Abatacept	No	No f	No	No hay datos	No hay datos g
Belimumab	No	No f	No	No hay datos	No hay datos g
<p>Para obtener más información y advertencias, consulte las recomendaciones relevantes y el texto principal en el resumen ejecutivo y la guía completa.</p> <p>a Los datos son limitados.</p> <p>b Solo en bebés sanos a término.</p> <p>c La concepción se puede mejorar al suspender Sulfasalacina durante 3 meses antes de la concepción.</p> <p>d Se sugiere la monitorización de la presión arterial materna, la función renal, la glucemia y los niveles de fármaco.</p> <p>e Considérese sólo en enfermedades maternas graves o que pongan en peligro la vida o los órganos.</p> <p>f Es poco probable que la exposición involuntaria en el primer trimestre sea dañina.</p> <p>g Es poco probable que sea dañino.</p>					